TRAITEMENT CONTRE LA POURRITURE BRUNE

URDOC
BIBLIOTHEQUE
N°
Date: 28 / 12 / 03

CE QUE L'ON FAIT	OU ? QUAND ? COMMENT ?	POURQUOI ?
1. Vérifier le pulvérisateur.	. En février - mars . A la case avant chaque traitement . Verser un peu d'eau propre dans le pulvérisateur . A travers le tamis . Actionner le levier . Appuyer sur la gâchette	. Pour s'assurer du bon fonctionnement de l'appareil et avoir le temps de se procurer les pièces de rechange . Pour ne pas introduire les saletés à l'intérieur du pulvérisateur . Pour mettre l'eau sous pression . Pour faire sortir l'eau par la buse
2. Ajuster les bretelles		. Pour que la sangle horizontale du pulvérisateur s'appuie un peu au-dessus de la ceinture . Pour faciliter le portage de l'appareil et travailler à l'aise.
3. Transporter le matériel	. Sur la plantation à traiter, à proximité d'un point d'eau : — Pulvérisateur — Seau et cuvette — Sachets de produit — Bâton propre — Matchette	. Pour faciliter la préparation de la bouillie . Pour éviter les pertes de temps

JOO
1628



1



2



3

CE QUE L'ON FAIT	OU ? QUAND ? COMMENT ?	POURQUOI ?
4. Puiser de l'eau	. A l'aide d'un seau ou récipient	. Pour préparer la bouillie
5. Préparer la bouillie	. Après avoir lu attentivement le mode d'emploi du fongicide utilisé — Exemple du BURCOP: . Verser très lentement le contenu *d'un seul sachet dose* dans un seau rempli au 3/4 . Remuer très longuement avec un bâton propre.	. Parce que chaque produit a son mode d'utilisation propre . Plusieurs sachets doses dans un même appareil n'augmentent pas pas l'efficacité du produit, au contraire la bouillie concentrée risque de boucher la canalisation de l'appareil et d'occasionner des brûlures de fleurs et de jeunes cabosses. On aboutit à un gaspillage du produit. . Pour obtenir un mélange homogène sans grumeaux.
6. Actionner le levier du pulvérisateur (pulvérisateur à pression entretenue)	. 4 à 5 fois avant de verser la bouillie dans le réservoir	. Pour comprimer l'air de la cloche à air . Pour faciliter l'évacuation du produit, l'appareil étant déjà sous pression.



A



5



6



7



8



9





10



11

CE QUE L'ON FAIT	OU ? QUAND ? COMMENT ?	POUQUOI ?
12. Actionner le levier	. Plusieurs fois	. Pour envoyer la bouillie sous pression dans la cloche à air
13. Régler le jet	. Dans le cas d'une buse réglable	. Pour avoir un jet évasé ou effilé suivant les cabosses à traiter (hautes ou basses)
14. Traiter les cabosses	. Enlever toute cabosse présentant la moindre tâche brune avant le traitement. . En tenant la lance, la buse dirigée vers le haut. . A une distance minimum de 40 cm des cabosses à traiter . En appuyant sur la gâchette . En tournant autour du cacaoyer . à traiter	. Pour éviter toute contamination des cabosses saines . Pour que le brouillard mouille bien toute la surface de la cabosse notamment celle qui est vers l'arbre *Trop loin,* une partie du jet est inutilisée *Trop près,* le produit attaque un point de la cabosse et s'écoule au sol . Pour libérer la bouillie sous pression Pour couvrir toutes les cabosses de bouillie



12



13



14





5e
aitement

CE QUE L'ON FAIT	OU ? QUAND ? COMMENT ?	POURQUOI ?
	· En évitant de mouiller les fleurs avec le produit · En ne traitant que les cabosses	· Pour éviter qu'elles soient détruites · La pourriture brune n'attaque que les cabosses · Pour économiser la bouillie
En petite saison des pluies 15. Traiter les cabosses basses	· Jusqu'à hauteur d'homme · Quand les cherelles atteignent 8 à 12 cm Dès les premières pluies et avant l'apparition de la maladie · Traiter souvent, en moyenne un traitement tous les 10 à 15 jours. En période de fortes pluies, traiter plus fréquemment · 5 à 6 traitements d'avril à juillet.	· Si la R.S. a été bien faite, la contamination ne peut venir que du sol (par le bas). · Parce que le traitement est préventif · C'est la couche du produit qui empêche la pénétration du parasite · Une cabosse déjà atteinte ne peut plus être guérie par le traitement · Parce que le produit est lavé par la pluie et la cabosse se trouve sans protection Parce que les cabosses grossissent Parce qu'il apparaît toujours de nouvelles cabosses à protéger.


1er
Traitement
2e
Traitement
3e
Traitement
4e
Traitement
5e
Traitement



CE QUE L'ON FAIT	OU ? QUAND ? COMMENT ?	POURQUOI ?
En grande saison des pluies : 16. Traiter toutes les cabosses accessibles.	· En se servant de la buse réglable · 4 à 5 traitements de fin août à fin octobre · En cas de pluies pendant la petite saison sèche, ne pas oublier de traiter.	· Pour atteindre les cabosses hautes · Parce que les conditions sont très favorables au développement de la maladie et que les risques de contamination sont plus grands.
17. Après chaque traitement, enlever toutes les cabosses présentant la moindre tâche brune	· Jusqu'au 4e jour après le traitement · En examinant soigneusement toutes les cabosses	· Parce que le parasite peut avoir pénétré dans la cabosse avant le traitement et continuer à se développer
18. Nettoyer le pulvérisateur	· Après chaque traitement (voir fiche entretien du pulvérisateur)	· Pour éviter les pannes
19. Laver à grande eau les récipients ayant servi à la préparation de la bouillie		· Pour éviter de s'intoxiquer
20. Se laver soigneusement les mains	· Après avoir nettoyé tout le matériel : — Pulvérisateur — Récipients	· Pour éviter de s'intoxiquer


1ª T.


2ª T.


3ª T.


4ª T.

5ª T.


17


18
19


20